



ВАЖНО!!! СТОЛБНЯК

Столбняк — инфекционное заболевание, вызываемое ядовитым токсином бактерий клостридий. Бактерия обитает в почве, уличной пыли, огороде, в садах, на лугах. В организм попадает через поврежденную слизистую и кожу (например, при ранениях).

К группе риска относятся все дети!!!

Столбняк развивается исключительно у непривитых или у тех, кто неполностью привит (например, пропущена плановая ревакцинация)! Приводит к развитию судорог мышц, выраженность которых порой доводит до развития переломов костей и позвоночника. Лечение таких больных проводится в палатах интенсивной терапии, часто необходимо подключение искусственного легкого. Нередко заболевание заканчивается смертельным исходом.

Профилактика столбняка заключается в проведении своевременной и полной вакцинации столбнячным анатоксином, который входит в состав комбинированных вакцин АКДС, АДС и АДС – М.

АКДС — коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина, представляет собой смесь убитых коклюшных микробов и дифтерийного и столбнячного анатоксина (очищенный продукт жизнедеятельности микроорганизмов). Используется для вакцинации и ревакцинации детей до 4 –х летнего возраста, не болевших коклюшем.

Побочные эффекты: местная реакция в виде покраснения или уплотнения, повышение температуры тела, аллергические реакции, крапивница.

Противопоказания:

- острое заболевание (вакцинация возможна через 1 месяц после выздоровления);
- хроническое заболевание (вакцинация проводится во время ремиссии);
- прогрессирующее тяжелое заболевание нервной системы;
- судороги (после консультации невролога);
- сильная реакция на предшествующее введение вакцины (повышение температуры тела выше 40 градусов, отек и гиперемия в месте введения выше 8 см).

АДС - анатоксин — содержит дифтерийный и столбнячный анатоксины. Используется для:

- вакцинации детей с 4-х до 6-ти лет, ранее не привитых АКДС;
- вакцинации детей (в плановом порядке) до 6-ти лет, перенесших коклюш.

АДС - М анатоксин — анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный с уменьшенным содержанием антигенов. Используется для:

- плановых ревакцинаций в 6-7 лет, 14 лет и далее каждые 10 лет;
- вакцинации детей с сильной реакцией или осложнением на введение АКДС, АДС;

Побочные эффекты (общие для АДС и АДС-М): местная реакция, повышение температуры тела аллергические реакции, крапивница.

Противопоказания (общие для АДС и АДС-М):

- острое заболевание (вакцинация возможна через 1 месяц после выздоровления);
- хроническое заболевание (вакцинация проводится во время ремиссии);
- прогрессирующее заболевание нервной системы;
- сильная реакция на предыдущее введение вакцины.